

METODA APLIKACI A ROZSAH JAK TO FUNGUJE

DOPORUČENÝ TERMÍN FOLIÁRNÍ APLIKACE PROSTŘEDEKU ALBIT[®]Max A KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBIT[®]Max

ALBIT[®]Max

POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN

ALBIT[®] obsahuje čistou účinnou látku, přírodní biopolymer - poly-beta-hydroxy máselnou kyselinu, získanou mikrobiální fermentací z půdních bakterií *Bacillus megaterium* a *Pseudomonas aureofaciens*.

ALBIT[®] vzájemně reaguje s receptory NADPH-oxidázy systému rostlin, umístěnými na povrchu buněk. Aktivizace NADPH-oxidázy vlivem ALBITu vyvolává syntézu kyseliny salicylové – mimořádně aktivní signální spojení. Tím pádem **ALBIT[®] zajišťuje** indukovanou rezistenci proti chorobám.

DOPORUČENÝ TERMÍN APLIKACE **PŘÍPRAVKU ALBIT[®]** V RŮZNÝCH FÁZÍCH RŮSTU ROSTLIN SYSTÉMEM BBCH

FÁZE RŮSTU ROSTLIN: KLASIFIKACE


Pro různé fáze vývoje rostlin jsou charakteristické zvláštní jevy, které jsou studovány v rámci samostatné vědy-fenologie. Vzhledem k rozmanitosti přístupů a široké škále jejich použití neexistuje jednotná klasifikace fází růstu plodin. V současné době většina vědců, kteří zkoumají fenologické fáze v kontextu průmyslového zemědělství, doporučuje použít systém BBCH. Klasifikace systému BBCH je založena na Zadoxové stupnici, která se používá k odhadu růstu obilovin. Podle BBCH existuje deset hlavních fází (s číslováním od 0 do 9), které jsou zase rozděleny do několika fází.

MEZI HLAVNÍ FÁZE RŮSTU OBILOVIN PATŘÍ:

- 0. klíčení; ➤ 1. vzcházení; ➤ 2. odnožování; ➤ 3. sloupkování (prodlužovací růst); ➤ 4. naduření listové pochvy;
- 5. metání; ➤ 6. kvetení; ➤ 7. tvorba zrn; ➤ 8. zrání; ➤ 9. odumírání.

Vzhledem k tomu, že u různých kultur se délka růstových fází a doprovodné fenologické jevy liší, je pro každou z nich vyvinuta individuální komplexní stupnice. Zároveň je standartní stupnice BBCH vhodná pro všechny plodiny, pro které neexistuje žádná samostatná klasifikace. Na jeho základě lze také navrhnout jednotlivé stupnice pro konkrétní druh rostlin.





KDO VLASTNĚ JSEM A CO UMÍM?

POMÁHÁM ROSTLINÁM TÍM,
CO JSEM SE NAUČIL OD **SAMOTNÉ PŘÍRODY** ...

PŘÍRODA SI NENECHÁ OD CIVILIZACE COKOLIV LÍBIT. TO NENÍ HESLO EKOLOGICKÝCH AKTIVISTŮ, ALE ZKUŠENOST KAŽDÉHO Z NÁS. PROBLÉMY, KTERÉ S NÁMI MÁ, UMÍ SAMA NEJLÉPE NAKONEC VYŘEŠIT. ALE NIKDY ZÁROVEŇ NEODMÍTÁ I MOŽNOSTI DALŠÍ POMOCI.

PROTO JSEM TU I JÁ – ALBIT MAX!

Můj starší sourozenec se jmenuje **ALBIT**, avšak já jsem oproti němu nejenom zdatnější a všestrannější, ale díky inovativní péči našich tvůrců **silnější a šikovnější**. Oba využíváme svých schopností a účinků, které jsme získali jako nejpřirozenější přírodní produkt od svých bakteriálních „stvořitelů“. V půdním prostředí se během milionů let vyvinulo gigantické množství mikroorganismů. Dnes se jich díky tomu vejde do malé lžičky tolik, jako je všech lidí na planetě. Naše podstata **existence je ve formě čistého hydrolyzátu účinné látky**, vyrobené ze dvou půdních baktérií, které v přírodních podmínkách žijí na kořenech rostlin. V mém případě jsem se ještě při inovativní péči svých tvůrců navíc musel podrobit zvláštnímu stimulačnímu procesu, známému v botanice rostlin jako vernalizace, neboli jarovizace. V jeho řízených podmínkách jsem do vínku dostal silnější schopnosti, kterými rostlinám lépe a účinněji pomáhám především při **odolávání a zvládání stresů z chladu a mrazu, ale i sucha**. Živé mikroorganismy však neobsahují, proto se dobře skladují.

- ✓ **Příznivě ovlivňuji fyzikálně** – chemické vlastnosti a mikrobiální rozmanitost v půdě, čímž umožňuji rostlinám daleko lépe přijímat **potřebné živiny z ní**.
- ✓ **Stimuluji rozvoj** rozvětveného a zdravého kořenového systému, který daleko lépe pomáhá rostlinám **při stresech v suchu a nedostatku vody**.
- ✓ **Zvyšuji koncentraci** chlorofylu a fotosyntetickou aktivitu, díky tomu dochází k lepšímu využití sluneční energie a CO₂, což přináší **větší růst a výnosy**.
- ✓ **Posiluji odolnost** rostlin proti abiotickým i biotickým stresům, zvláště se zaměřuji na následky mrazových událostí u teplotně citlivých komodit, **zejména vinné révy a ovocných keřů a stromů**.
- ✓ **Aktivuji obranné mechanismy** stimulací tvorby signálních molekul, jež jsou základem imunitní odpovědi rostlin, které pak efektivněji **reagují na napadení patogeny nebo škůdci**.

ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám **(fytoftorové vadnutí rajčete, alternariová a septoriová skvrnitost listů rajčete, padlí rajčete atd.)**
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření provedte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **RAJČAT** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBITEM

cena postřiku 20 Kč / 1 ml

Cena rajčat (Kč/kg)	30	45
Zisk z navýšení výnosu o 100 kg / 100 m²	3000	4500
Náklady na doporučené aplikace (cena 1 aplikace 20 Kč / 1 ml)	24	24
Čistý zisk celkem (Kč/kg)	2976	4476

DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI
ALBIT MAX U RAJČAT

Dávka přípravku: 0,4 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: co nejdříve po výsadbě



BRAMBORY

ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (**Plíseň bramboru, hnědá skvrnitost bramborových listů, aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru, kořenomorka bramborová, atd.)**
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **BRAMBOR** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBITEM

cena postřiku 20 Kč / 1 ml

Cena brambor (Kč/kg)	15	25
Zisk z navýšení výnosu o 40 kg / 100 m²	600	1000
Náklady na doporučené aplikace (cena 1 aplikace 20 Kč / 1 ml)	60	60
Čistý zisk celkem (Kč/kg)	540	940

DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI ALBIT MAX U BRAMBOR

Dávka přípravku: 1 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: od výšky rostlin 10-15cm



PAPRIKA

ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (oubové vadnutí, peronospora aj. listové a stonkové choroby. Aplikace spolu s CaNO3 brání všem chorobám plodů rajčete a papriky)
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **PAPRIKY** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBITEM

cena postřiku 20 Kč / 1 ml

Cena papriky (Kč/kg)	45	65
Zisk z navýšení výnosu o 200 kg / 100 m²	9000	13000
Náklady na doporučené aplikace (cena 1 aplikace 20 Kč / 1 ml)	24	24
Čistý zisk celkem (Kč/kg)	8976	12976

DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI ALBIT MAX U PAPRIKY

Dávka přípravku: 0,4 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: co nejdříve po výsadbě



- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (fuzariová hniloba cibule, plíseň cibulová)
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **PÓRU, CIBULE, ČESNEKU** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBITEM

cena postřiku 20 Kč / 1 ml

Cena cibule světlá (Kč/kg)	10	20
Zisk z navýšení výnosu o 100 kg / 100 m²	1000	2000
Náklady na doporučené aplikace (cena 1 aplikace 20 Kč / 1 ml)	24	24
Čistý zisk celkem (Kč/kg)	976	1976

DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI ALBIT MAX U PÓRU, CIBULE, ČESNEKU

Dávka přípravku: 0,4 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: při výšce cca 10 cm



KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA

KEDLUBNY, KAPUSTA, BROKOLICE,
KVĚTÁK, ZELÍ

ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (bakteriální hniloby částí rostlin určených k jídlu, houbové zahnívání listů a vnitřních částí květů)
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **KOŠŤÁLOVOU ZELENINU** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBITEM

cena postřiku 20 Kč / 1 ml

Cena kapusta hlávková (Kč/kg)	20	40
Zisk z navýšení výnosu o 100 kg / 100 m²	2000	4000
Náklady na doporučené aplikace (cena 1 aplikace 20 Kč / 1 ml)	30	30
Čistý zisk celkem (Kč/kg)	1970	3970



DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI ALBIT MAX U KOŠŤÁLOVOU ZELENINU

Dávka přípravku: 0,5 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: 2-4 pravé listy, nebo ihned po výsadbě



KOŘENOVÁ ZELENINA

MRKEV, PETRŽEL, CELER

ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (Alternariová skvrnitost mrkve, padlí miříkovitých, septoriová skvrnitost celeru)
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **KOŘENOVOU ZELENINU** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBITEM

cena postřiku 20 Kč / 1 ml

Cena Mrkev a karotka (Kč/kg)	12	22
Zisk z navýšení výnosu o 100 kg / 100 m²	1200	2200
Náklady na doporučené aplikace (cena 1 aplikace 20 Kč / 1 ml)	18	18
Čistý zisk celkem (Kč/kg)	1182	2182

DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI ALBIT MAX U KOŘENOVOU ZELENINU

Dávka přípravku: 0,3 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: 2-4 pravé listy (celer ihned po výsadbě)



ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (Plíseň révy, padlí révy, šedá hniloba hroznů révy)
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **RÉVY VINNÉ** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 5x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBITEM

cena postřiku 20 Kč / 1 ml

Cena révy vinné (Kč/kg)	10	15
Zisk z navýšení výnosu o 400 kg / 100 m²	4000	6000
Náklady na doporučené aplikace (cena 1 aplikace 20 Kč / 1 ml)	200	200
Čistý zisk celkem (Kč/kg)	3800	5800

DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI
ALBIT MAX U RÉVY VINNÉ

Dávka přípravku: 2,0 ml

Objem vody: 2,5 - 3,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: tvorba květenství-začátek kvetení (až 5x za sezonu, nejlépe v kombinaci s fungicidy - tankmix)



ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (Kořenové hniloby, bílá hniloba hrachu, plíseň hrachu, šedá plísňovitost hrachu)
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **HRÁCHU** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBITEM		
cena postřiku 20 Kč / 1 ml		
Cena hrachu (Kč/kg)	40	60
Zisk z navýšení výnosu o 40 kg / 100 m²	1600	2400
Náklady na doporučené aplikace (cena 1 aplikace 20 Kč / 1 ml)	24	24
Čistý zisk celkem (Kč/kg)	1576	2376

DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI
ALBIT MAX U HRÁCHU

Dávka přípravku: 0,4 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: od výšky rostlin 5-10cm



ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (Plíseň šedá, fytophtorová hniloba rhizomů a plodů jahodníku, padlí jahodníkové)
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **JAHO**DNÍKU se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBITEM

cena postřiku 20 Kč / 1 ml

Cena jahodníku (Kč/kg)	120	150
Zisk z navýšení výnosu o 100 kg / 100 m²	12000	15000
Náklady na doporučené aplikace (cena 1 aplikace 20 Kč / 1 ml)	24	24
Čistý zisk celkem (Kč/kg)	11976	14976

DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI
ALBIT MAX U JAHODNÍKU

Dávka přípravku: 0,4 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: před kvetením (co nejdříve na jaře)



ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (plíseň sněžná a paluška na travinách, padlí, (rzi))
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **TRÁVNÍKU** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.


DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI ALBIT MAX U TRÁVNÍKU

Dávka přípravku: 0,5 - 1,0 ml

Objem vody: 3,5 - 10,0 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: při obnově jarní vegetace



ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (padlí, tmavé (černé) skvrnitosti listů, plíseň šedá na květech)
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **KVĚTIN ZAHRADNÝCH** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI ALBIT MAX U KVĚTIN ZAHRADNÝCH

Dávka přípravku: 0,4 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: po výsadbě, trvalky před kvetením



ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (padlí, tmavé (černé) skvrnitosti listů)
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **KVĚTIN POKOJOVÝCH** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.


DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI ALBIT MAX U KVĚTIN POKOJOVÝCH

Dávka přípravku: 0,6 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: v období duben-říjen (co 6-8 týdnů, max. 5x za sezonu)



BOBULOVINY

RYBÍZ, ANGREŠT, MALINY, OSTRUŽINY...

ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (plíseň šedá, padlí a omezuje americké padlí)
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření provedte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **BOBULOVIN** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBITEM

cena postřiku 20 Kč / 1 ml

Cena maliny (Kč/kg)	245	320
Zisk z navýšení výnosu o 100 kg / 100 m²	2450	3200
Náklady na doporučené aplikace (cena 1 aplikace 20 Kč / 1 ml)	36	36
Čistý zisk celkem (Kč/kg)	2414	3164

DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI ALBIT MAX U BOBULOVIN

Dávka přípravku: 0,6 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: před květem



ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (náročné, protože nejvíce škodí peronospóry)
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **RAKYTNÍKU** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.


DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI ALBIT MAX U RAKYTNÍKU

Dávka přípravku: 3 ml na půdu + 1 ml na list

Objem vody: 3 L + 1,5 -2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: aplikace na půdu brzy na jaře + před květem (na list)



ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (listové skvrnitosti (altenária, septoria, helmintosporia))
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **BYLINEK** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBITEM

cena postřiku 20 Kč / 1 ml

Cena libečku (Kč/kg)	240	670
Zisk z navýšení výnosu o 100 kg / 100 m²	2400	6700
Náklady na doporučené aplikace (cena 1 aplikace 20 Kč / 1 ml)	24	24
Čistý zisk celkem (Kč/kg)	2376	6676


DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI
ALBIT MAX U BYLINEK

Dávka přípravku: 0,4 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: po obnově jarní vegetace



ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (Rez růží, padlí růží, černá skvrnitost listů růží)
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **RŮŽE** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBITEM

cena postřiku 20 Kč / 1 ml

Cena růže (Kč/kg)	15	25
Zisk z navýšení výnosu o 40 kg / 100 m²	600	1000
Náklady na doporučené aplikace (cena 1 aplikace 20 Kč / 1 ml)	30	30
Čistý zisk celkem (Kč/kg)	570	970

DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI
ALBIT MAX U RŮŽE

Dávka přípravku: 0,7 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: zjara, při obnově růstu (5-10cm nové přírůstky)



ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (Strupovitost jabloně, padlí jabloňové)
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření proveďte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U **JÁDROVIN** se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 5x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBITEM

cena postřiku 20 Kč / 1 ml

Cena jablka idared (Kč/kg)	10	15
Zisk z navýšení výnosu o 600 kg / 100 m²	6000	9000
Náklady na doporučené aplikace (cena 1 aplikace 20 Kč / 1 ml)	100	100
Čistý zisk celkem (Kč/kg)	5900	8900

DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI
ALBIT MAX U JÁDROVIN

Dávka přípravku: 1,0 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: květ ve fázi „myší ouško“



ALBIT MAX MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI

- jedná se o pomocný přípravek na ochranu rostlin
- aplikaci postřikem v raných fázích rostlin zlepšuje kondici a zdravotní stav rostlin
- svým „systémovým“ působením v rostlině zvyšuje odolnost vůči mnoha houbovým chorobám rostlin
- zajištění indukované rezistence (imunity) proti chorobám (Strupovitost peckovin, moniliová hniloba peckovin, padlí broskvoně)
- bez ochranné lhůty
- je vhodný pro ekologické zemědělství

JAK JEJ POUŽÍT?

- postřikem na rostliny
- první postřik od fáze 2 listů
- další ošetření provedte za 3-4 týdny
- maximálně 2-5x za vegetaci (podle plodin)

METODIKA

U PECKOVIN se doporučuje přidávat přípravek postřikem od fáze 2 vyvinutých listů. Max. 5x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů.

KALKULACE ČISTÉHO ZISKU S ALBITEM

cena postřiku 20 Kč / 1 ml

Cena meruňky (Kč/kg)	20	40
Zisk z navýšení výnosu o 100 kg / 100 m²	2000	4000
Náklady na doporučené aplikace (cena 1 aplikace 20 Kč / 1 ml)	200	200
Čistý zisk celkem (Kč/kg)	1800	3800


DOPORUČENÁ DÁVKOVÁNÍ PRO FOLIÁRNÍ APLIKACI
ALBIT MAX U PECKOVIN

Dávka přípravku: 2,0 ml

Objem vody: 1,5 - 2,5 L

Plocha: 100 m²

Další údaje k aplikaci od: počátek kvetení





ALBIT®Max
PŘÍTEL
DO NEPOHODY!



mayline

Václavské nám. 807/64, 11000
Nové Město, Praha, Česká republika



JEDINEČNOST ÚČINKŮ ALBIT®MAX



ZVYŠUJE ODOLNOST ROSTLIN

Zvyšuje odolnost rostlin vůči suchu, mrazům a dalším nepříznivým faktorům prostředí.



NEUTRALIZUJE STRESUJÍCÍ ÚČINKY

Zmírňuje anebo neutralizuje stresující účinky při používání pesticidů, přesazování, sekání, tím zvyšuje účinnost hnojiv a pesticidů, zlepšuje úrodnost půdy.



ZVYŠUJE KVALITU PLODIN

Zvyšuje kvalitu plodin, včetně obsahu vitamínů, antioxidantu a dalších prospěšných nutričních látek.



BEZPEČNOST

Bezpečný pro lidi, zvířata, rostliny a včely.



EKONOMIKA

Zcela zanedbatelné náklady na aplikace a jejich mimořádná návratnost.



ZVYŠUJE VÝNOS VŠECH ZÁKLADNÍCH PLODIN

Zvyšuje výnos všech základních plodin o **8-15%**. Zvyšuje klíčivost semen. Zkracuje dobu potřebnou pro pěstování plodin.




ZVYŠUJE IMUNITU ROSTLINY PŘED NEMOCEMI

Zvyšuje imunitu rostlin vůči široké škále onemocnění (rez, pat stébel, padlí, fuzariózy, plíseň, sněť, hniloba, cercosporiáza, spála, hlízenka, bakterióza atd. celkem cca 90 nemocí).



PODPORA PŘEMĚNY POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ

Akceleruje rozkladné procesy u posklizňových zbytků a zlepšuje kvalitu půdy, včetně pozitivních účinků na produkci u následných plodin.



DOBŘÁ KOMPATIBILITA

Kompatibilní s insekticidy, fungicidy, herbicidy a hnojivy.



SNIŽOVÁNÍ SKLADOVACÍCH ZTRÁT

Snižuje díky svým účinkům ztráty při skladování plodin (cukrovka, brambory aj.)

Kontaktujte Nás

POTŘEBUJETE PORADIT?
KONTAKTUJTE NAŠE
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE



EVA DUŠKOVÁ
ředitelka obchodního
oddělení
☎ +420 773 550 670
✉ e.duskova@albitcz.eu



LUDEK KRAMNÝ
obchodní zástupce
☎ +420 724 106 607
✉ kramnyl@albitcz.eu



Ing. ARSEN MUZAFAROV
obchodní zástupce
☎ +420 775 940 078
✉ a.muzaфарov@albitcz.eu



SVATOSLAV STASIEV
obchodní zástupce
☎ +420 773 730 567
✉ s.stasiev@albitcz.eu